



El fentanilo es un **50 VECES** MÁS POTENTE que la morfina¹ opioide sintético aproximadamente

Muchas personas están expuestas al fentanilo sin saberlo, mientras que otras lo usan intencionalmente debido a su potencia.


¡LAS MUERTES POR SOBREDOSIS EN LOS ESTADOS UNIDOS SUPERARON LAS 100,000 POR PRIMERA VEZ EN UN PERÍODO DE 12 MESES!

El 64 % de estas muertes estuvieron relacionadas con opioides sintéticos, principalmente fentanilos fabricados de manera ilícita (illicitly manufactured fentanyls, IMF) (mayo de 2020-abril de 2021)²

Esto es superior a las más de 91,000 muertes por sobredosis que ocurrieron el año anterior. (diciembre de 2019-diciembre de 2020)³



Aunque la región noreste continúa sufriendo las muertes por sobredosis más altas, varias regiones del país mostraron aumentos pronunciados en muertes relacionadas con el IMF.²



Noreste	Aumento del 3.5 %; 5,194 muertes
Centro-Oeste	Aumento del 33.1 %; 2,010 muertes
Sur	Aumento del 64.7 %; 4,342 muertes
Oeste	Aumento del 93.9 %; 1,852 muertes

²En jurisdicciones que participan en el Sistema Estatal de Informes de Sobredosis No Intencionales por Drogas (State Unintentional Drug Overdose Reporting System, SUDORS).

¡EL FENTANILO ESTÁ AFECTANDO A LAS MINORÍAS A UNA VELOCIDAD ALARMANTE!

Las personas de raza negra no hispanas tuvieron la tasa de mortalidad más alta por opioides sintéticos distintos de la metadona en 2020. Además, entre 2013 y 2020, los cambios más altos en esta tasa fueron para: personas de raza negra no hispanas, hispanos, personas de raza blancas no hispanas.⁴



47.6 veces

Las muertes por sobredosis relacionadas con IMF aumentaron 47.6 veces entre las personas de raza negra no hispanas.⁴



35.7 veces

Las muertes por sobredosis relacionadas con el IMF aumentaron 35.7 veces entre los hispanos.⁴



15.9 veces

Las muertes por sobredosis relacionadas con el IMF aumentaron 15.9 veces entre las personas de raza blanca no hispanas.⁴



PUEDA AYUDAR A SALVAR VIDAS: ¡LLEVE SIEMPRE NALOXONA!



UNA SOBREDOSIS PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER LUGAR.

Si sospecha de una sobredosis de opioides, administre NALOXONA y obtenga asistencia médica de emergencia de inmediato. La NALOXONA es un medicamento pequeño y fácil de transportar que revierte rápidamente una sobredosis de opioides.



¿Busca NALOXONA?

Visite: www.naloxoneforall.org

CÓMO RECONOCER LAS SEÑALES DE UNA SOBREDOSIS.



NO RESPONDE



RESPIRACIÓN IRREGULAR



PIEL DE COLOR GRIS, AZUL O PÁLIDA



PUPILAS MUY PEQUEÑAS

CÓMO REVERTIR UNA SOBREDOSIS.

¡La acción inmediata salva vidas! Las leyes del Buen Samaritano lo protegen cuando intenta ayudar a alguien que lo necesita.

LLAME AL 911 INMEDIATAMENTE

Llame al 911 o indique a alguien cercano que llame y diga que está brindando apoyo ante una supuesta sobredosis.



ADMINISTRE NALOXONA

Aunque la persona no responda, 1) anuncie que va a administrar naloxona; 2) rocíe la naloxona en la nariz de la persona.



HAGA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (CPR)

Incline la cabeza de la persona hacia atrás para asegurarse de que las vías respiratorias estén abiertas.

Realice compresiones torácicas.



VUELVA A ADMINISTRAR NALOXONA

Administre naloxona adicional si la persona no recupera el color o la respiración; de lo contrario, continúe con las compresiones torácicas hasta que llegue la ayuda.



MANTÉNGASE CALMADO Y TRANQUILO

Si la persona es reanimada, manténgase calmado y compasivo, y animela a aceptar ayuda o permanecer en un lugar público.



La reducción del daño (en inglés Harm Reduction) tiene por objeto mantener a las personas seguras de una manera práctica. **Consejos simples:**

LLEVE NALOXONA | NUNCA USE DROGAS SOLO | VAYA LENTO | ANALICE SUS DROGAS

HAGA UNA PRUEBA DE FENTANILO A SUS DROGAS.

 RESULTADO POSITIVO DE FENTANILO



 TENGA CUIDADO



LAS TIRAS REACTIVAS DE FENTANILO SE PUEDEN USAR PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE FENTANILO EN SU SUSTANCIA.⁵

Incluso si sus drogas dan negativo en la prueba de fentanilo, tenga cuidado y recuerde los pasos a seguir para reducir el daño.

- Centers for Disease Control and Prevention. (n.d.). *Other Drugs*. Consultado el 16 de junio de 2021, de <https://www.cdc.gov/drugoverdose/data/otherdrugs.html>.
- O'Donnell J, Tanz LJ, Gladden RM, Davis NL, Bitting J. (2021). *Trends in and Characteristics of Drug Overdose Deaths Involving Illicitly Manufactured Fentanyl* -United States, 2019-2020. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 70(1740-1746). DOI: <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7050e3>
- Hedegaard H, Minino AM, Spencer MR, Warner M. (2021). *Drug overdose deaths in the United States, 1999-2020*. NCHS Data Brief, no 428. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. DOI: <https://dx.doi.org/10.15620/cdc:112340>.
- Agency for Healthcare Research and Quality. (n.d.). *Blacks Experiencing Fast-Rising Rates of Overdose Deaths Involving Synthetic Opioids Other than Methadone*. Consultado el 16 de junio de 2021, de <https://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/research/findings/nhqrd/dr/dataspotlight-opioid.pdf>
- How to Test Your Drugs Using Fentanyl Test Strips. [Folleto]. (n.d.) N.P. Consultado el 6 de abril de 2022, de <https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/basas/fentanyl-test-strips-brochure.pdf>.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2021). *Federal grantees may now use funds to purchase fentanyl test strips*. Consultado el 14 de septiembre de 2021, de <https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0407-Fentanyl-Test-Strips.html>
- CDC Health Advisory - <https://emergency.cdc.gov/han/2020/han00438.asp>

Descargo de responsabilidad: Este recurso fue financiado en parte con fondos federales de la Iniciativa de difusión de la Red de Ensayos Clínicos del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (n.º de contrato 75N95020C00028RFP). El contenido fue desarrollado por expertos e investigadores, y no refleja necesariamente la postura oficial del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, los Institutos Nacionales de Salud ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos; y la mención de nombres comerciales, prácticas comerciales u organizaciones no implica el respaldo del gobierno de los EE. UU. Esta información no debe considerarse un sustituto del asesoramiento legal ni de las decisiones de atención y tratamiento individualizadas del paciente.